

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Vite	21				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchini, melone, zucca, cocomero	3				
	Frumento, orzo	35				
	Riso	28				
	Barbabetola da zucchero	30				
BENALAXYL (fungicida)	Vite	20			Concia delle sementi di girasole. Tappeti erbosi di giardini e campi sportivi. Terreno di semenzai e taleai.	Applicazione alla coltura e al terreno. (*) Terreno destinato alla coltura.
	Fragola	-- (*)				
	Cipolla, pomodoro, peperone,	7				
	Lattuga	14				
	Patata	7				
	Tabacco	28				
BENFURACARB (insetticida)	Floreali, ornamentali	--			Semenzai, vivai.	Solo applicazione al terreno prima o al momento della semina o del trapianto.
	Fragola	--				
	Carota, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone, cavolo	--				
	Patata	--				
	Mais	--				
	Barbabetola da zucchero	--				
	Tabacco	--				
BENOMYL (fungicida)	Floreali, ornamentali	--	Mele, pere ⁽¹⁾	15	Concia delle sementi di ortaggi, barbabetola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori. Disinfezione delle talee di garofano.	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). (*) Impiego solo in campo.
	Nocciolo	--				
	Mandorlo, melo, pero, drupacee (escluso il ciliegio), vite	15				
	Frumento	30				
	Floreali, ornamentali ^(*)	--				

¹ L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.