

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note					
<b>LAMBDA-CYHALOTHRIN</b> (insetticida)	Mandorlo, nocciolo, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, fragola, lampone, ribes nero, uva spina, actinidia .....	7	Cereali in granella .....	-- (1)		Divieto di impiego in serra.					
	Vite .....	21									
	Carota, ravanella, aglio, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, zuccchino, fagiolino, finocchio, porro, lenticchia .....	3									
	Cetriolo, cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci, cavoli di Bruxelles, cicoria, fagiolo, pisello, fava, sedano, carciofo...	7									
	Arachide, soia, colza, ravizzone, cotone.	15									
	Girasole .....	70									
	Patata .....	15									
	Luppolo .....	15									
	Barbabietola da zucchero .....	7									
	Fruento, orzo, segale, avena, sorgo .....	30									
	Mais .....	15									
	Erba medica .....	7									
	Prati, pascoli, mais, loglio, barbabietole da foraggio .....	15									
	Tabacco .....	60									
	Floreali, ornamentali, forestali .....	--									
	<b>LENACIL</b> (diserbante)	Spinacio .....					30				Applicazione in pre-emergenza delle infestanti (*) Applicazione in pre- e post-emergenza delle infestanti
		Fruento .....					30				
Barbabietola da zucchero(*) .....		30									
Barbabietola da foraggio.....		30									

(1) Prima della molitura, per l'avvio al consumo, sia umano sia animale, i cereali vanno sottoposti ad un'ideale pulitura mediante vagliature, ventilazione con aria compressa, spazzolatura ad acqua e decorticazione.