

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
<b>PIRIMIPHOS-METHYL</b> (insetticida - acaricida)	Limone, arancio, vite da vino.....	14	Cereali in granella	--	Concia delle sementi di cavoli, spinacio, cocomero, melone, fagiolo, pisello, orzo, mais, sorgo, riso, colza, lino, erba medica, trifoglio, barbabietola da foraggio. Trattamento preventivo dei magazzini destinati alla conservazione dei cereali. Tappeti erbosi.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Carota, pomodoro, peperone, cetriolo, cavoli a infiorescenza, cavoli di Bruxelles, spinacio .....	14				
	Patata .....	14				
	Barbabietola da zucchero .....	14				
	Mais, riso .....	14				
	Floreali, pioppo .....	--				
<b>PROPICONAZOLE</b> (fungicida)	Albicocco, ciliegio, pesco, susino .....	14				
	Melone, carciofo .....	14				
	Frumento, orzo, segale, avena .....	28				
	Riso .....	42				
	Barbabietola da zucchero .....	21				
	Rosa .....	--				
<b>PROPOXUR</b> (insetticida)	Carota, cipolla, porro .....	10			Applicazione localizzata contro il tarlo delle piante arboree da legno e forestali.	
	Patata .....	10				
	Tabacco .....	10				
	Floreali, ornamentali .....	--				
<b>PROPYZAMIDE</b> (diserbante)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, rovo, lampone .....	--			Vivai, piantonai, barbatellai di vite.	Applicazione al terreno in pre- o post-emergenza delle infestanti.
	Lattughe e simili, bietola da costa .....	--				
	Barbabietola da zucchero .....	--				
	Foraggiere leguminose .....	--				
	Ornamentali, forestali .....	--				