

Sostanza attiva	Colture in campo per le quali l'impiego è revocato
METALAXYL	Agrumi, ciliegio, actinidia, pesco, peperone, spinacio, cipolla, cavolfiore, cavolo broccolo
METHOMYL	Cavolfiore, cavolo cappuccio
PIRIMIPHOS-METHYL	Melo, pero, susino, vite da tavola, fragola, cipolla, cocomero, cavoli a testa (esclusi i cavoli di Bruxelles), cavoli a foglia, cavoli rapa, lattuga, legumi freschi, sedano
PROPICONAZOLE	Peperone
PROPOXUR	Agrumi, melo, pero, albicocco, pesco, susino, vite, olivo, pomodoro, cetriolo, cavoli, lattughe e simili, fagiolo, pisello, carciofo
PROPYZAMIDE	Carciofo, ribes, fagiolo
QUINALPHOS	Agrumi, susino, olivo, actinidia, cipolla, solanacee, cavoli, lattuga, spinacio, fagiolo, pisello, fagiolino, fava, carciofo, patata
THIODICARB	Impiego fogliare su melo, vite ^(*)
TRIAZOPHOS	Nocciolo, melo, pero, fragola, cavolfiore, cavolo cappuccio, patata, mais
TRIFORINE	Mandorlo, vite, fragola, melone, cocomero, carciofo

^(*) Rimane autorizzato l'impiego come esca per applicazione al terreno