

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
<b>BROMOXYLIL FENOLO</b> (diserbante)	Mais, sorgo .....	--				
<b>CARBENDAZIM</b> (fungicida)	Nocciolo .....	--	Mele, pere <sup>(1)</sup> .....	15	Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori. Disinfezione delle talee di garofano. Cicatrizante per drupacee, pomacee, vite, ornamentali, forestali.	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). <sup>(*)</sup> Impiego solo in campo.
	Mandorlo, melo, pero, drupacee (escluso il ciliegio), vite .....	15				
	Fumento .....	30				
	Floreali, ornamentali <sup>(*)</sup> .....	--				
<b>CARBOFURAN</b> (insetticida)	Aglio, cipolla .....	--				Solo applicazione al terreno
	Patata .....	--				
	Barbabietola da zucchero .....	--				
	Mais .....	--				
<b>CARBOSULFAN</b> (insetticida)	Pomodoro .....	--				Solo applicazione al terreno al momento della semina
	Girasole .....	--				
	Patata .....	--				
	Mais .....	--				
	Barbabietola da zucchero .....	--				
	Tabacco .....	--				
	Floreali, ornamentali .....	--				

<sup>(1)</sup> L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.