

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
MYCLOBUTANIL (fungicida)	Melo, pero, vite Albicocco, pesco, susino Fragola Pomodoro, peperone, cetriolo, zucchini, cocomero, melone Frumento Rosa, garofano	15 7 3 3 30 --				
OXYFLUORFEN (diserbante)	Pompelmo, limone, arancio, mandarlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite Aglio, cipolla, carciofo Cavoli Girasole	-- -- -- (*) --			Vivai di piante forestali e ornamentali, taleai e piantonai di pioppo ed eucalipto. Aree industriali e civili, bordi stradali, argini. Sedi ferroviarie	Applicazione in pre-emergenza delle infestanti. (*) Solo applicazione al terreno prima del trapianto
PHORATE (insetticida)	Carota, solanacee, zucchini, cavoli, fagiolo, pisello, sedano Patata Mais Barbabetola da zucchero Tabacco Floreali, ornamentali	60 60 60 60 60 --			Vivai di piante ornamentali.	Solo applicazione al terreno all'epoca della semina o del trapianto.