

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
PYRIMETHANIL (fungicida)	Melo, pero	14				(*) Solo impiego in colture protette
	Vite	21				
	Fragola	3				
	Pomodoro, peperone(*), cetriolo(*)	3				
	Lattuga, fagiolini(*)	14				
	Ciclamino	--				
QUINALPHOS (insetticida)	Melo, pero, pesco, vite.....	28				
	Mais	60				
	Barbabietola da zucchero	21				
	Foraggiere leguminose	21				
	Tabacco	60				
	Floreali, ornamentali	--				
THIABENDAZOLE (fungicida)	Melo, pero	15	Mele, pere ⁽¹⁾	30	Concia delle sementi di cipolla, aglio, patata, frumento, riso. Conservazione delle patate da seme. Semenzai di colture di tabacco. Cicatrizante per drupacee, pomacee, castagno, noce, forestali, pioppo. Iniezioni al tronco per platano	Applicazione alla coltura (melo) e al terreno (garofano).
	Funghi	5	Patate ⁽¹⁾	30		
	Garofano	--				

⁽¹⁾ L'impiego in post raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dalla autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/1962.