

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
THIODICARB (insetticida)	Melo	70 ^(*)				Divieto di impiego in serra. (*) Solo applicazione al terreno sottoforma di esca.
	Pero	60				
	Pesco	19				
	Vite da vino	70 ^(*)				
	Pomodoro, melanzana, peperone, zucchini, cavolfiore, cavolo cappuccio, lattuga, finocchio, carciofo	15 ^(*)				
	Fumento, orzo	130 ^(*)				
	Garofano	--				
THIOPHANATE-METHYL (fungicida)	Nocciolo.....	--	Mele, pere ⁽¹⁾	15	Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cereali e delle sementi e bulbi di fiori	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). (*) Impiego solo in campo.
	Melo, pero, albicocco, pesco, susino, vite ..	15				
	Fumento	30				
	Floreali, ornamentali ^(*)	--				
TRIAZOPHOS (insetticida)	Barbabietola da zucchero	45				
	Floreali, ornamentali	--				
TRIFORINE (fungicida)	Melo.....	14				
	Drupacee.....	7				
	Cetriolo, zucchini.....	7				
	Asparago	--				
	Fumento, orzo, segale	21				
	Floreali, ornamentali	--				

⁽¹⁾ L'impiego in post- raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.